

【帯状疱疹予防における水痘生ワクチンとシングリックスの比較】

	水痘生ワクチン(帯状疱疹予防)	帯状疱疹ワクチン(シングリックス)
	生ワクチン(病原性を弱めた細菌・ウイルスを成分とする)	不活化ワクチン(病原性をなくした細菌・ウイルスが一部を成分)
対象者(任意接種)	50歳以上	50歳以上
接種回数	1回	2回 (1回目から2ヶ月後に2回目)
費用	¥8,000(税別)	¥20,000×2回(税別)
注射方法	皮下注射	筋肉注射
発症予防効果	50～60歳代 60～70%	50歳代以上 97% 70歳代以上 70%
発症予防期間	約5年	約10年
副反応	<ul style="list-style-type: none"> ・注射部位の紅斑・かゆみ・熱感・腫脹・疼痛・硬結 ・倦怠感 ・発疹 (まれに)・アナフィラキシーショック ・血小板減少性紫斑病 ・無菌性髄膜炎 	<ul style="list-style-type: none"> ・注射部位の紅斑・かゆみ・熱感・腫脹・疼痛 ・倦怠感 ・アナフィラキシーショック など ※水痘ワクチンに比べこれらの副反応が強くなる傾向がある ・その他の胃腸症状など
接種できない方	<ul style="list-style-type: none"> ・明らかに発熱している(37.5℃以上) ・重篤な急性疾患にかかっている方 ・水痘・帯状疱疹のワクチンに含まれる成分で過去にアナフィラキシーを起こした方 ・透析中の方 ・悪性腫瘍治療中の方,免疫機能に異常のある疾患の方 ・副腎皮質ステロイド剤や免疫抑制剤などの内服や注射を使用中の方 	<ul style="list-style-type: none"> ・明らかに発熱している(37.5℃以上) ・重篤な急性疾患にかかっている方 ・過去にこのワクチンの成分でアナフィラキシーを起こした方 ・医師が予防接種を受けることが不相当と判断した方

OBPクリニック

2023年7月作成